Vorlesung 10b

Markovketten

Teil 1

Eine wichtige Beispielklasse mehrstufiger Zufallsexperimente:

Eine wichtige Beispielklasse mehrstufiger Zufallsexperimente:

alle X_i haben ein-und denselben Wertebereich S

und die Übergangswahrscheinlichkeiten der nächsten Stufe

hängen nur von der aktuellen Stufe ab

(und nicht von den vorhergehenden):

Eine wichtige Beispielklasse mehrstufiger Zufallsexperimente:

alle X_i haben ein-und denselben Wertebereich S

und die Übergangswahrscheinlichkeiten der nächsten Stufe

hängen nur von der aktuellen Stufe ab

(und nicht von den vorhergehenden):

$$P(\dots a_{i-2} a_{i-1}, a_i) = P(a_{i-1}, a_i)$$

In dem Fall spricht man von einer **Markovkette**
auf dem Zustandsraum S mit Übergangsmatrix P .

Die Stufen sind jetzt mit $i = 0, 1, 2, \dots$ indiziert.

Man denkt sich die **Übergangsmatrix** P als fest und notiert die **Verteilung** ρ von X_0 (die “Startverteilung”) als Subskript bei der Wahrscheinlichkeit P .

Die Multiplikationsregel ergibt:

$$P_\rho(X_0 = a_0, \dots, X_n = a_n)$$

Die Stufen sind jetzt mit $i = 0, 1, 2, \dots$ indiziert.

Man denkt sich die **Übergangsmatrix** P als fest und notiert die **Verteilung** ρ von X_0 (die “Startverteilung”) als Subskript bei der Wahrscheinlichkeit $\mathbf{P}$.

Die Multiplikationsregel ergibt:

$$\begin{aligned} & \mathbf{P}_\rho(X_0 = a_0, \dots, X_n = a_n) \\ &= \rho(a_0) P(a_0, a_1) \cdots P(a_{n-1}, a_n) \end{aligned}$$

Startet die Kette in $a \in S$,
dann ist ρ die auf a konzentrierte Verteilung

Startet die Kette in $a \in S$,
dann ist ρ die auf a konzentrierte Verteilung
(notiert als $\rho = \delta_a$).

Startet die Kette in $a \in S$,
dann ist ρ die auf a konzentrierte Verteilung
(notiert als $\rho = \delta_a$).

Statt P_{δ_a} schreibt man auch P_a
und erhält

Startet die Kette in $a \in S$,
dann ist ρ die auf a konzentrierte Verteilung
(notiert als $\rho = \delta_a$).

Statt $\mathbf{P}_{\delta_a}$ schreibt man auch $\mathbf{P}_a$
und erhält

$$\mathbf{P}_a(X_0 = a) = 1,$$

Startet die Kette in $a \in S$,
dann ist ρ die auf a konzentrierte Verteilung
(notiert als $\rho = \delta_a$).

Statt $\mathbf{P}_{\delta_a}$ schreibt man auch $\mathbf{P}_a$
und erhält

$$\mathbf{P}_a(X_0 = a) = 1,$$

$$\mathbf{P}_a(X_1 = a_1, \dots, X_n = a_n) = P(a, a_1) \cdots P(a_{n-1}, a_n) .$$

Beispiel 1:

Muster der Länge 2 beim fairen Münzwurf

Beispiel 1:

Muster der Länge 2 beim fairen Münzwurf

Graph der Übergangswahrscheinlichkeiten:

Beispiel 2:

(p, q) -Irrfahrt auf $\mathbb{Z}$:

$$S = \mathbb{Z}$$

$$P(k, k + 1) = p, \quad P(k, k - 1) = 1 - p =: q$$

Beispiel 3:

Einfache Irrfahrt

auf einem (ungerichteten oder gerichteten) Graphen

$S :=$ die Menge der Knoten.

Beispiel 3:

Einfache Irrfahrt

auf einem (ungerichteten oder gerichteten) Graphen

$S :=$ die Menge der Knoten.

Der nächste Schritt erfolgt jeweils
zu einem rein zufällig ausgewählten Nachbarn.

Beispiel 4:
Pólya-Urne

$$S = \{(w, b) : w, b \in \mathbb{N}\} = \mathbb{N}^2$$

$$P((w, b), (w + 1, b)) = \frac{w}{w + b},$$

Beispiel 4:
Pólya-Urne

$$S = \{(w, b) : w, b \in \mathbb{N}\} = \mathbb{N}^2$$

$$P((w, b), (w + 1, b)) = \frac{w}{w + b},$$

$$P((w, b), (w, b + 1)) = \frac{b}{w + b}.$$

Zur Erinnerung:

Für eine Markovkette $X = (X_0, X_1, \dots)$
mit Start in a und Übergangsmatrix P

hat man die Wahrscheinlichkeiten

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_a(X_1 = a_1, X_2 = a_2, \dots, X_n = a_n) \\ = P(a, a_1)P(a_1, a_2) \cdots P(a_{n-1}, a_n). \end{aligned}$$

Zerlegung nach dem ersten Schritt.

$$P_a(X_1 = a_1, X_2 = a_2, \dots, X_n = a_n)$$

Zerlegung nach dem ersten Schritt.

$$\begin{aligned} P_a(X_1 = a_1, X_2 = a_2, \dots, X_n = a_n) \\ = P(a, a_1)P(a_1, a_2) \cdots P(a_{n-1}, a_n) \end{aligned}$$

Zerlegung nach dem ersten Schritt.

$$\begin{aligned} & \mathbf{P}_a(X_1 = a_1, X_2 = a_2, \dots, X_n = a_n) \\ &= P(a, a_1)P(a_1, a_2) \cdots P(a_{n-1}, a_n) \\ &= P(a, a_1)\mathbf{P}_{a_1}(X_1 = a_2, \dots, X_{n-1} = a_n) \end{aligned}$$

Zerlegung nach dem ersten Schritt.

$$\begin{aligned} & \mathbf{P}_a(X_1 = a_1, X_2 = a_2, \dots, X_n = a_n) \\ &= P(a, a_1)P(a_1, a_2) \cdots P(a_{n-1}, a_n) \\ &= P(a, a_1)\mathbf{P}_{a_1}(X_1 = a_2, \dots, X_{n-1} = a_n) \end{aligned}$$

Zerlegung nach dem ersten Schritt.

$$\begin{aligned} & \mathbf{P}_a(X_1 = a_1, X_2 = a_2, \dots, X_n = a_n) \\ &= P(a, a_1)P(a_1, a_2) \cdots P(a_{n-1}, a_n) \\ &= P(a, a_1)\mathbf{P}_{a_1}(X_1 = a_2, \dots, X_{n-1} = a_n) \end{aligned}$$

Summation über $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$,

mit b statt a_1 und c statt a_n :

$$\mathbf{P}_a(X_n = c) = \sum_{b \in S} P(a, b) \mathbf{P}_b(X_{n-1} = c) .$$

Transport von Erwartungswerten.

Wir betrachten eine Funktion $h : S \rightarrow \mathbb{R}_+$

und interessieren uns für

$$u_n(a) := \mathbf{E}_a[h(X_n)] = \sum_{c \in S} h(c) \mathbf{P}_a(X_n = c) .$$

Transport von Erwartungswerten.

Wir betrachten eine Funktion $h : S \rightarrow \mathbb{R}_+$

und interessieren uns für

$$u_n(a) := \mathbf{E}_a[h(X_n)] = \sum_{c \in S} h(c) \mathbf{P}_a(X_n = c) .$$

$u_n(a)$ lässt sich als Mittel über die $u_{n-1}(b)$ ausdrücken

über eine Zerlegung nach dem ersten Schritt:

$$\sum_{c \in S} h(c) \mathbf{P}_a(X_n = c) = \sum_{c \in S} h(c) \sum_{b \in S} P(a, b) \mathbf{P}_b(X_{n-1} = c)$$

Transport von Erwartungswerten.

Wir betrachten eine Funktion $h : S \rightarrow \mathbb{R}_+$

und interessieren uns für

$$u_n(a) := \mathbf{E}_a[h(X_n)] = \sum_{c \in S} h(c) \mathbf{P}_a(X_n = c) .$$

$u_n(a)$ lässt sich als Mittel über die $u_{n-1}(b)$ ausdrücken

über eine Zerlegung nach dem ersten Schritt:

$$\sum_{c \in S} h(c) \mathbf{P}_a(X_n = c) = \sum_{c \in S} h(c) \sum_{b \in S} P(a, b) \mathbf{P}_b(X_{n-1} = c)$$

$$\mathbf{E}_a[h(X_n)] = \sum_{b \in S} P(a, b) \mathbf{E}_b[h(X_{n-1})], \quad a \in S$$

$$\mathbf{E}_a[h(X_n)] = \sum_{b \in S} P(a, b) \mathbf{E}_b[h(X_{n-1})], \quad a \in S$$

ist gleichbedeutend mit

$$u_n(a) = \sum_{b \in S} P(a, b) u_{n-1}(b), \quad a \in S.$$

oder in Vektor-Matrixschreibweise, mit u_n als Spaltenvektor
und der Anfangsbedingung $\mathbf{E}_a[h(X_0)] = h(a)$

$$\begin{cases} u_n = P u_{n-1}, & n \geq 1 \\ u_0 = h. \end{cases}$$

Treffwahrscheinlichkeiten

P sei eine Übergangsmatrix auf der Menge S

X sei Markovkette mit Übergangsmatrix P .

$C \subset S$, $c \in C$ seien fest.

Treffwahrscheinlichkeiten

Die Frage:

P sei eine Übergangsmatrix auf der Menge S

X sei Markovkette mit Übergangsmatrix P .

$C \subset S$, $c \in C$ seien fest.

Wie wahrscheinlich ist es,
dass der in $a \in S$ startende Pfad
die Menge C erstmals
im Zustand c trifft?

Treffwahrscheinlichkeiten

Die Antwort:

Sei $w(a)$ die gesuchte Wahrscheinlichkeit.

Die $w(a)$, $a \in S$, erfüllen das Gleichungssystem

$$\sum_{b \in S} P(a, b)w(b) = w(a)$$

für $a \in S \setminus C$

Treffwahrscheinlichkeiten

Die Antwort:

Sei $w(a)$ die gesuchte Wahrscheinlichkeit.

Die $w(a)$, $a \in S$, erfüllen das Gleichungssystem

$$\sum_{b \in S} P(a, b)w(b) = w(a)$$

für $a \in S \setminus C$

Treffwahrscheinlichkeiten

Die Antwort:

Sei $w(a)$ die gesuchte Wahrscheinlichkeit.

Die $w(a)$, $a \in S$, erfüllen das Gleichungssystem

$$\sum_{b \in S} P(a, b)w(b) = w(a)$$

für $a \in S \setminus C$,

$$w(a) = \delta_{ac} \quad \text{für } a \in C.$$

Treffwahrscheinlichkeiten

Die Antwort:

Sei $w(a)$ die gesuchte Wahrscheinlichkeit.

Die $w(a)$, $a \in S$, erfüllen das Gleichungssystem

$$\sum_{b \in S} P(a, b)w(b) = w(a)$$

für $a \in S \setminus C$,

$$w(a) = \delta_{ac} \quad \text{für } a \in C.$$

Die Begründung sehen wir uns
jetzt genauer an.

Treffwahrscheinlichkeiten

Die Antwort:

Sei $w(a)$ die gesuchte Wahrscheinlichkeit.

Die $w(a)$, $a \in S$, erfüllen das Gleichungssystem

$$\sum_{b \in S} P(a, b)w(b) = w(a)$$

für $a \in S \setminus C$,

$$w(a) = \delta_{ac} \quad \text{für } a \in C.$$

Das Stichwort ist: Zerlegung
nach dem ersten Schritt.

Treffereignisse

$E_n := \{ \text{der zufällige Pfad } X \text{ trifft die Menge } C \text{ erstmals in } n \text{ Schritten, und zwar im Punkt } c \}$

Erste Treffzeit:

$$T_C := \min\{n : X_n \in C\}$$

Erste Treffzeit:

$$T_C := \min\{n : X_n \in C\}$$

$$E_n = \{T_C = n, X_{T_C} = c\}$$

Erste Treffzeit:

$$T_C := \min\{n : X_n \in C\}$$

$$E_n = \{T_C = n, X_{T_C} = c\}$$

Für $b \in S$ ist

$$\mathbf{P}_b(E_0) = \delta_{bc} := \begin{cases} 1 & \text{für } b = c, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Erste Treffzeit:

$$T_C := \min\{n : X_n \in C\}$$

$$E_n = \{T_C = n, X_{T_C} = c\}$$

Für $b \in S$ ist

$$\mathbf{P}_b(E_0) = \delta_{bc} := \begin{cases} 1 \text{ für } b = c, \\ 0 \text{ sonst.} \end{cases}$$

Für $a \notin C$ ist

$$\mathbf{P}_a(E_1) = P(a, c) = \sum_{b \in S} P(a, b) \mathbf{P}_b(E_0)$$

$$T_C = \min\{n : X_n \in C\}$$

$$E_n = \{T_C = n, X_{T_C} = c\}$$

Für $n \geq 1$, $a \notin C$:

$$\mathbf{P}_a(E_n) = \sum_{b \in S} P(a, b) \mathbf{P}_b(E_{n-1})$$

Summation über $n \geq 1$, mit $E := \{T_C < \infty, X_{T_C} = c\}$:

$$\mathbf{P}_a(E) = \sum_{b \in S} P(a, b) \mathbf{P}_b(E), \quad a \notin C$$

$$T_C = \min\{n : X_n \in C\}$$

$$E = \{T_C < \infty, X_{T_C} = c\}$$

Bei Start in $a \in C$ ist $T_C = 0$ und $X_{T_C} = a$,
also ist für $a \in C$

$$\mathbf{P}_a(E) = \delta_{ac} = \begin{cases} 1 & \text{für } a = c, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Treffwahrscheinlichkeiten

$$T_C = \min\{n : X_n \in C\}$$

$$E = \{T_C < \infty, X_{T_C} = c\}$$

Fazit:

Die Abbildung $w : a \mapsto \mathbf{P}_a(E)$ erfüllt das Gleichungssystem

$$\sum_{b \in S} P(a, b)w(b) = w(a) \text{ für } a \in S \setminus C, \quad w(a) = \delta_{ac} \text{ für } a \in C$$

Beispiel A

Welches Muster kommt eher?

Mit welcher W'keit kommt beim fairen Münzwurf das Muster

KKK früher als das Muster *WKW*?

Beispiel A

Welches Muster kommt eher?

Mit welcher W'keit kommt beim fairen Münzwurf das Muster KKK früher als das Muster WKW ?

Hier ist ein
“reduzierter Graph”
der relevanten
Zustände
und Übergänge:

Für $w(a) :=$

$P_a(\text{Spiel endet in } KKK)$

ergibt sich das

Gleichungssystem

Für $w(a) :=$

$P_a(\text{Spiel endet in } KKK)$

ergibt sich das

Gleichungssystem

$$w(KK) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}w(W), \quad w(WK) = \frac{1}{2}w(KK)$$

$$w(K) = \frac{1}{2}w(KK) + \frac{1}{2}w(W), \quad w(W) = \frac{1}{2}w(WK) + \frac{1}{2}w(W).$$

Für $w(a) :=$

$P_a(\text{Spiel endet in } KKK)$

ergibt sich das

Gleichungssystem

$$w(KK) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}w(W), \quad w(WK) = \frac{1}{2}w(KK)$$

$$w(K) = \frac{1}{2}w(KK) + \frac{1}{2}w(W), \quad w(W) = \frac{1}{2}w(WK) + \frac{1}{2}w(W).$$

und daraus

$$w(W) = \frac{1}{3}, \quad w(K) = \frac{1}{2}, \quad w(*) = \frac{1}{2}w(W) + \frac{1}{2}w(K) = \frac{5}{12}.$$

Beispiel B: **Gewinn oder Ruin?**

Eine einfache Irrfahrt auf $\mathbb{Z}$ starte im Punkt 3.

Mit welcher W 'keit erreicht sie den Punkt $c = 10$,
bevor sie zum Nullpunkt kommt?

Beispiel B: Gewinn oder Ruin?

Eine einfache Irrfahrt auf $\mathbb{Z}$ starte im Punkt 3.

Mit welcher W'keit erreicht sie den Punkt $c = 10$,
bevor sie zum Nullpunkt kommt?

“Zerlegung nach dem ersten Schritt”

$$w(a) = \frac{1}{2}w(a-1) + \frac{1}{2}w(a+1), \quad a = 1, \dots, c-1,$$

Beispiel B: Gewinn oder Ruin?

Eine einfache Irrfahrt auf $\mathbb{Z}$ starte im Punkt 3.

Mit welcher W'keit erreicht sie den Punkt $c = 10$,
bevor sie zum Nullpunkt kommt?

“Zerlegung nach dem ersten Schritt” und Randbedingungen:

$$w(a) = \frac{1}{2}w(a-1) + \frac{1}{2}w(a+1), \quad a = 1, \dots, c-1,$$
$$w(0) = 0, \quad w(c) = 1.$$

Beispiel B: Gewinn oder Ruin?

Eine einfache Irrfahrt auf $\mathbb{Z}$ starte im Punkt 3.

Mit welcher W'keit erreicht sie den Punkt $c = 10$,
bevor sie zum Nullpunkt kommt?

“Zerlegung nach dem ersten Schritt” und Randbedingungen:

$$w(a) = \frac{1}{2}w(a-1) + \frac{1}{2}w(a+1), \quad a = 1, \dots, c-1,$$
$$w(0) = 0, \quad w(c) = 1.$$

Fazit: Die $w(a)$ liegen auf einer Geraden,

$$w(a) = \beta a + \gamma \quad \text{mit } \gamma = 0, \beta = 1/c.$$

Beispiel B: Gewinn oder Ruin?

Eine einfache Irrfahrt auf $\mathbb{Z}$ starte im Punkt 3.

Mit welcher W'keit erreicht sie den Punkt $c = 10$,
bevor sie zum Nullpunkt kommt?

“Zerlegung nach dem ersten Schritt” und Randbedingungen:

$$w(a) = \frac{1}{2}w(a-1) + \frac{1}{2}w(a+1), \quad a = 1, \dots, c-1,$$
$$w(0) = 0, \quad w(c) = 1.$$

Fazit: Die $w(a)$ liegen auf einer Geraden,

$$w(a) = \beta a + \gamma \quad \text{mit } \gamma = 0, \beta = 1/c.$$

Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist also $3/10$.

Beispiel C: **Kommt man je zurück?**

Einfache Irrfahrt auf $\mathbb{Z}$, $C := \{0\}$, $T_0 := T_C$.

$w_a := \mathbf{P}_a(T_0 < \infty)$ erfüllt

$$w(a) = \frac{1}{2}w(a-1) + \frac{1}{2}w(a+1), \quad a \neq 0,$$
$$w(0) = 1$$

Also ist $w(a) \equiv 1$ und

$$\mathbf{P}_0(\text{Rückkehr in endlicher Zeit}) = \frac{1}{2}w(-1) + \frac{1}{2}w(1) = 1.$$