

Vorlesung 5a

Zufallsvariable mit Dichten:


Transformationen, Exponentialverteilung,
Normalverteilung

Teil 1

Transformationen

Drei Beispiele:

A. Sei U uniform verteilt auf $[0, 1]$. Gefragt ist nach Verteilungsfunktion und Dichte von $X := U^2$.



Drei Beispiele:

A. Sei U uniform verteilt auf $[0, 1]$. Gefragt ist nach Verteilungsfunktion und Dichte von $X := U^2$.

$$F_X(b) = \mathbf{P}(X \leq b) = \mathbf{P}(U \leq \sqrt{b}) = \sqrt{b}, \quad 0 \leq b \leq 1.$$

Drei Beispiele:

A. Sei U uniform verteilt auf $[0, 1]$. Gefragt ist nach Verteilungsfunktion und Dichte von $X := U^2$.

$$F_X(b) = \mathbf{P}(X \leq b) = \mathbf{P}(U \leq \sqrt{b}) = \sqrt{b}, \quad 0 \leq b \leq 1.$$

$$\sqrt{b} \stackrel{!}{=} \int_0^b f(a) da, \quad 0 \leq b \leq 1.$$

$$f(b) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{b}}, & 0 < b \leq 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad \text{ist Dichtefunktion von } X.$$

B. Sei U uniform verteilt auf $[0, 2]$. Gefragt ist nach Verteilungsfunktion und Dichte von $X := U^2$.

B. Sei U uniform verteilt auf $[0, 2]$. Gefragt ist nach Verteilungsfunktion und Dichte von $X := U^2$.

X hat Wertebereich $[0, 4]$.

$$F_X(b) = \mathbf{P}(X \leq b) = \mathbf{P}(U \leq \sqrt{b}) = \frac{1}{2}\sqrt{b}, \quad 0 < b \leq 4.$$

B. Sei U uniform verteilt auf $[0, 2]$. Gefragt ist nach Verteilungsfunktion und Dichte von $X := U^2$.

X hat Wertebereich $[0, 4]$.

$$F_X(b) = \mathbf{P}(X \leq b) = \mathbf{P}(U \leq \sqrt{b}) = \frac{1}{2}\sqrt{b}, \quad 0 < b \leq 4.$$

$$\frac{1}{2}\sqrt{b} \stackrel{!}{=} \int_0^b f(a) da, \quad 0 < b \leq 4.$$

$$f(b) = \begin{cases} \frac{1}{4} \frac{1}{\sqrt{b}}, & 0 \leq b \leq 4 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad \text{ist Dichtefunktion von } X.$$

C. Sei U uniform verteilt auf $[0, 1]$.

Gefragt ist nach der Dichte von $X := -\ln U$.

C. Sei U uniform verteilt auf $[0, 1]$.

Gefragt ist nach der Dichte von $X := -\ln U$.

$$\begin{aligned}\mathbf{P}(X \leq b) &= \mathbf{P}(-\ln U \leq b) = \mathbf{P}(\ln U \geq -b) \\ &= \mathbf{P}(U \geq e^{-b}) = \mathbf{P}(U \in [e^{-b}, 1]) \\ &= 1 - e^{-b} \stackrel{!}{=} \int_0^b f(a) da, \quad b \geq 0.\end{aligned}$$

C. Sei U uniform verteilt auf $[0, 1]$.

Gefragt ist nach der Dichte von $X := -\ln U$.

$$\begin{aligned}\mathbf{P}(X \leq b) &= \mathbf{P}(-\ln U \leq b) = \mathbf{P}(\ln U \geq -b) \\ &= \mathbf{P}(U \geq e^{-b}) = \mathbf{P}(U \in [e^{-b}, 1]) \\ &= 1 - e^{-b} \stackrel{!}{=} \int_0^b f(a) da, \quad b \geq 0.\end{aligned}$$

$$f(b) = \begin{cases} e^{-b}, & b \geq 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad \text{ist Dichtefunktion von } X.$$

Zufallsvariable X mit der Eigenschaft

$$\mathbf{P}(X > b) = e^{-b}, \quad b \geq 0,$$

sind uns schon (implizit) begegnet

bei der Approximation der Verteilung von pT ;

dabei war T Geom(p)-verteilt mit kleinem p .

Wir sprachen damals von der

Exponentialapproximation der geometrischen Verteilung,

siehe V4a.

Affin lineare Transformation:

X habe Verteilungsfunktion F_X .

Was ist dann die **Verteilungsfunktion von $Y := \beta X + \gamma$** ?

Dabei sei $\beta > 0$.

Affin lineare Transformation:

X habe Verteilungsfunktion F_X .

Was ist dann die **Verteilungsfunktion von $Y := \beta X + \gamma$** ?

Dabei sei $\beta > 0$.

$$\begin{aligned} & F_Y(b) \\ &= \mathbf{P}(Y \leq b) = \mathbf{P}(\beta X + \gamma \leq b) \\ &= \mathbf{P}(\beta X \leq b - \gamma) = \mathbf{P}\left(X \leq \frac{b - \gamma}{\beta}\right) \\ &= F_X\left(\frac{b - \gamma}{\beta}\right) \end{aligned}$$

X habe Dichte $f_X(a)da$.

Was ist dann die **Dichte von $Y := \beta X + \gamma$** ?

Der Einfachheit halber nehmen wir an:

Die Dichtefunktion f_X ist stückweise stetig.

Dann ist in allen Stetigkeitspunkten

$$f_Y(b) = F'_Y(b) = F'_X\left(\frac{b - \gamma}{\beta}\right) \frac{1}{\beta}$$

X habe Dichte $f_X(a)da$.

Was ist dann die **Dichte von $Y := \beta X + \gamma$** ?

Der Einfachheit halber nehmen wir an:

Die Dichtefunktion f_X ist stückweise stetig.

Dann ist in allen Stetigkeitspunkten

$$f_Y(b) = F'_Y(b) = F'_X\left(\frac{b - \gamma}{\beta}\right) \frac{1}{\beta}$$

Die Dichte von Y ist somit **$f_Y(b) db = f'_X\left(\frac{b - \gamma}{\beta}\right) \frac{db}{\beta}$**

Zum Merken: Schlag nach beim Urbild,
und vergiss den Streckungsfaktor nicht!