Vorlesung 6b

Normalverteilung und Zentraler Grenzwertsatz

Teil 1:

Die Standardnormalverteilung auf $\mathbb{R}^2$

(vgl. Buch S. 71)

Zur Erinnerung:

Eine $\mathbb{R}$-wertige Zufallsvariable Z mit Dichte

$$\boxed{\varphi(a)\,da := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-a^2/2}\,da}$$

heißt standard-normalverteilt (auf $\mathbb{R}^1$).



$$\rho_1(a_1) = \sum_{a_2} \rho(a_1, a_2)$$

$$f_1(a_1)\,da_1 = \int_{\mathbb{R}} f(a_1, a_2)\,da_2\,da_1$$

$\forall a_1, a_2: \varrho(a_1, a_2) = \varrho_1(a_1) \cdot \varrho_2(a_2) \Leftrightarrow X_1$ und X_2 unabh.

Wichtige Beobachtung:

Z_1, Z_2 seien standard-normalverteilt und unabhängig.

$Z = (Z_1, Z_2)$ hat dann die Dichte



$$\varphi(a_1)\,da_1\;\varphi(a_2)\,da_2$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-a_1^2/2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-a_2^2/2}\, da_1 da_2$$

$$= \frac{1}{2\pi} e^{-|a|^2/2}\, da, \quad a = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2, \; |a|^2 := a_1^2 + a_2^2.$$

Die Dichte ist rotationssymmetrisch!

$|a| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$
$\therefore$ der Abstand von a zu 0

$$f(a_1, a_2) =$$

$$\frac{1}{2\pi} e^{-(a_1^2 + a_2^2)/2}$$



Definition:

Eine $\mathbb{R}^2$-wertige Zufallsvariable Z mit Dichte

$$f(a)\,da = \frac{1}{2\pi} e^{-|a|^2/2}\,da, \quad a \in \mathbb{R}^2,$$

heißt **standard-normalverteilt auf** $\mathbb{R}^2$.

Aufgabe:

Berechne $\mathbf{P}(|Z|^2 > b)$ $= \mathbb{P}(|Z| > \sqrt{b})$

für ein auf $\mathbb{R}^2$ standard-normalverteiltes Z

und $b > 0$.



Aufgabe:

Berechne $\mathbf{P}(|Z|^2 > b)$

für ein auf $\mathbb{R}^2$ standard-normalverteiltes Z

und $b > 0$.

Anders formuliert:

Berechne $\mathbf{P}(Z \in A)$

mit $A := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 > b\}$

Aufgabe:

Berechne $\mathbf{P}(|Z|^2 > b)$

für ein auf $\mathbb{R}^2$ standard-normalverteiltes Z

und $b > 0$.

Anders formuliert:

Berechne $\mathbf{P}(Z \in A)$

mit $A := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 > b\}$

Zu berechnen ist also

$$\frac{1}{2\pi} \iint_A e^{-(x^2+y^2)/2} dx\, dy$$

Zur Illustration der Polarkoordinatentransformation:

$$\iint_G e^{-(x^2+y^2)/2}\, dx\, dy = \iint_H e^{-r^2/2}\, r\, dr\, d\theta$$



Speziell mit $G := A$ und $H := (\sqrt{b}, \infty) \times [0, 2\pi)$:





Speziell mit $G := A$ und $H := (\sqrt{b}, \infty) \times [0, 2\pi)$:

$$\iint_{\{(x,y):x^2+y^2>b\}} e^{-(x^2+y^2)/2}\, dx\, dy = \int_0^{2\pi} \int_{\sqrt{b}}^{\infty} e^{-r^2/2}\, r\, dr\, d\theta$$

$$\left(-e^{-\frac{r^2}{2}}\right)' = r\, e^{-\frac{r^2}{2}}$$

Speziell mit $G := A$ und $H := (\sqrt{b}, \infty) \times [0, 2\pi)$:

$\mathbb{P}(|Z|^2 > b) =$

$$\frac{1}{2\pi} \iint_{\{(x,y):x^2+y^2>b\}} e^{-(x^2+y^2)/2}\, dx\, dy = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_{\sqrt{b}}^{\infty} e^{-r^2/2}\, r\, dr\, d\theta$$

$$= \frac{2\pi}{2\pi}(-e^{-r^2/2})\Big|_{\sqrt{b}}^{\infty} = e^{-b/2}.$$

$|Z|^2$ ist $\mathrm{Exp}(1/2)$-verteilt.

$|Z|^2 = Z_1^2 + Z_2^2$

$\mathbb{E}[|Z|^2] = 2$

$\mathbb{E}[Z_1^2] = \mathrm{Var}[Z_1] = 1$

Speziell mit $G := A$ und $H := (\sqrt{b}, \infty) \times [0, 2\pi)$:

$$\iint\limits_{\{(x,y):x^2+y^2>b\}} e^{-(x^2+y^2)/2}\, dx\, dy = \int_0^{2\pi} \int_{\sqrt{b}}^{\infty} e^{-r^2/2}\, r\, dr\, d\theta$$

$$= 2\pi(-e^{-r^2/2})\,\Big|_{\sqrt{b}}^{\infty} = 2\pi e^{-b/2}.$$

$$\mathbf{P}(|Z|^2 > b) = \mathbf{P}(Z \in A)$$

Speziell mit $G := A$ und $H := (\sqrt{b}, \infty) \times [0, 2\pi)$:

$$\iint\limits_{\{(x,y):x^2+y^2>b\}} e^{-(x^2+y^2)/2}\, dx\, dy = \int_0^{2\pi} \int_{\sqrt{b}}^{\infty} e^{-r^2/2}\, r\, dr\, d\theta$$

$$= 2\pi(-e^{-r^2/2})\,\Big|_{\sqrt{b}}^{\infty} = 2\pi e^{-b/2}.$$

$$\mathbf{P}(|Z|^2 > b) = \mathbf{P}(Z \in A)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \iint\limits_A e^{-(x^2+y^2)/2}\, dx\, dy = e^{-b/2}.$$

Speziell mit $G := A$ und $H := (\sqrt{b}, \infty) \times [0, 2\pi)$:

$$\iint\limits_{\{(x,y):x^2+y^2>b\}} e^{-(x^2+y^2)/2}\, dx\, dy = \int_0^{2\pi} \int_{\sqrt{b}}^{\infty} e^{-r^2/2}\, r\, dr\, d\theta$$

$$= 2\pi(-e^{-r^2/2})\,\Big|_{\sqrt{b}}^{\infty} = 2\pi e^{-b/2}.$$

$$\mathbf{P}(|Z|^2 > b) = \mathbf{P}(Z \in A)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \iint\limits_A e^{-(x^2+y^2)/2}\, dx\, dy = e^{-b/2}.$$

$|Z|^2$ ist Exp$\left(\frac{1}{2}\right)$-verteilt!

Eine Folgerung aus der Rotationssymmetrie

(vgl Buch S. 71)

Z_1 und Z_2 seien unabhängig und standard-normalverteilt.

Wir wollen einsehen, dass dann auch

$$\frac{Z_1 + Z_2}{\sqrt{2}}$$

standard-normalverteilt ist.

hat Varianz 1



Z_1 und Z_2 seien unabhängig und standard-normalverteilt.

Wir wollen einsehen, dass dann auch

$$\frac{Z_1 + Z_2}{\sqrt{2}}$$

standard-normalverteilt ist.

Dafür gibt es ein schönes geometrisches Argument.

Sei $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$ die Standardbasis in $\mathbb{R}^2$.

Wir fassen das zufällige Zahlenpaar $Z = (Z_1, Z_2)$ auf

als die Koordinaten des zufälligen Vektors

$$\vec{Z} = Z_1 \vec{e}_1 + Z_2 \vec{e}_2$$

und stellen fest:



- Z_1 ist die Koordinate von $\vec{Z}$ bgl. des Einheitsvektors $\vec{e}_1$.
- $\frac{Z_1 + Z_2}{\sqrt{2}}$ ist die Koordinate von $\vec{Z}$ bgl. des Einheitsvektors

$$\vec{u}_{\text{diag}} := \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{e}_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{e}_2.$$

- Die Verteilung von $\vec{Z}$ ist rotationssymmetrisch

Also ist Z_1 so verteilt wie $\frac{Z_1+Z_2}{\sqrt{2}}$.

- Z_1 ist die Koordinate von $\vec{Z}$ bgl. des Einheitsvektors $\vec{e}_1$.
- $\frac{Z_1 + Z_2}{\sqrt{2}}$ ist die Koordinate von $\vec{Z}$ bgl. des Einheitsvektors

$$\vec{u}_{\mathsf{diag}} := \tfrac{1}{\sqrt{2}}\vec{e}_1 + \tfrac{1}{\sqrt{2}}\vec{e}_2.$$

- Die Verteilung von $\vec{Z}$ ist rotationssymmetrisch

Also ist Z_1 so verteilt wie $\frac{Z_1+Z_2}{\sqrt{2}}$.

Und was dem Einheitsvektor $\vec{u}_{\mathsf{diag}}$ recht ist,

ist jedem Einheitsvektor $\vec{u} = \tau_1\vec{e}_1 + \tau_2\vec{e}_2$ billig !

Anders gesagt:

Sind Z_1, Z_2 unabhängig und N(0, 1)-verteilt,

dann gilt für jedes Zahlenpaar (τ_1, τ_2) mit $\tau_1^2 + \tau_2^2 = 1$:

$Y := \tau_1 Z_1 + \tau_2 Z_2$ ist N(0, 1)-verteilt.

(Denn Y ist die Koordinate von $\vec{Z} = Z_1 \vec{e}_1 + Z_2 \vec{e}_2$

zum Einheitsvektor $\vec{u} := \tau_1 \vec{e}_1 + \tau_2 \vec{e}_2$.)

Eine wichtige Folgerung hieraus:

Die Summe von

unabhängigen, normalverteilten Zufallsvariablen

ist wieder normalverteilt.

Eine wichtige Folgerung hieraus:

Die Summe von

unabhängigen, normalverteilten Zufallsvariablen

ist wieder normalverteilt.

Denn für Z_1, Z_2 unabhängig und $N(0,1)$-verteilt gilt:

$$\sigma_1 Z_1 + \sigma_2 Z_2 = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} \left(\frac{\sigma_1}{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}} Z_1 + \frac{\sigma_2}{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}} Z_2 \right)$$

ist $N(0, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$-verteilt.

und

$$(\sigma_1 Z_1 + \mu_1) + (\sigma_2 Z_2 + \mu_2) = (\sigma_1 Z_1 + \sigma_2 Z_2) + (\mu_1 + \mu_2).$$