Vorlesung 7a

Normalverteilung und Zentraler Grenzwertsatz

Teil 5

Warum gerade e^{-cx^2} ?

Am Ende von Teil 4 hatten wir (für $n = 100$) betrachtet:

$$Z_n := (S_n - \mathbf{E}S_n) / \sigma_{S_n} ,$$

$$\text{mit } S_n := X_1 + \cdots + X_n ,$$

$X_1, X_2, \dots$ unabhängig und uniform auf $[-0.5, 0.5]$.

Die Verteilung von Z_n war glockenförmig.

Was ist deren genaue Form für $n \rightarrow \infty$?

Glücklicher Einfall:

Nimm zwei unabhängige Kopien

$$(U, V) := (Z_{100}, Z'_{100})$$

Wie sieht die gemeinsame Verteilung
von U und V aus?

1000 Simulationen

2000 Simulationen

3000 Simulationen

4000 Simulationen

5000 Simulationen

6000 Simulationen

7000 Simulationen

8000 Simulationen

9000 Simulationen

10000 Simulationen

10000 Simulationen

Die Verteilung von (U, V) ist annähernd rotationssymmetrisch!

Eine Charakterisierung der zweidimensionalen Standardnormalverteilung

Behauptung:

Aus “ U und V unabhängig und identisch verteilt’

und

“Verteilung von (U, V) rotationssymmetrisch”

folgt,

dass U und V normalverteilt sind:

$$f_U(x) = f_V(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/(2\sigma^2)}$$

Denn:

U, V *unabhängig* bedeutet:

$$(*) \quad f_{(U,V)}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = f_U(\mathbf{a})f_V(\mathbf{b})$$

$f_{(U,V)}$ *rotationssymmetrisch* heißt: es existiert ein g mit

$$(**) \quad f_{(U,V)}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = g(r), \quad r := \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Mit $f_U = f_V =: h$ folgt aus $(*)$ und $(**)$:

$$h(\mathbf{a})h(\mathbf{b}) = g(r), \quad r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$h(a) h(b) = g(r), \quad r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Die zwei Paare (a, b) und $(0, \sqrt{a^2 + b^2})$ haben dasselbe r .

Also:

$$h(a) h(b) = h(0) h(\sqrt{a^2 + b^2})$$

Das ist eine Gleichung für h . Eine Lösung hiervon ist:

$$h(x) = e^{-x^2}$$

Denn

$$e^{-a^2} e^{-b^2} = 1 \cdot e^{-(a^2+b^2)}$$

$$h(a) h(b) = h(0) h(\sqrt{a^2 + b^2})$$

Wie sehen *alle* die h aus, die diese Beziehung erfüllen?

$$w(u) := h(\sqrt{u}), \quad u \geq 0, \text{ erfüllt}$$

$$w(a^2)w(b^2) = w(0)w(a^2 + b^2), \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

$$w(u) w(v) = k_0 w(u + v), \quad u, v \geq 0$$

hat als allgemeine Lösung

$$w(u) = k_0 e^{-k_1 u}, \quad k_1 \in \mathbb{R}.$$

Daraus folgt:

$$h(a) = w(a^2) = k_0 e^{-k_1 a^2}.$$

FAZIT

Der Zentrale Grenzwertsatz

lässt sich erraten

(in konkreten Fällen,

mit etwas Glück).