

Vorlesung 3a

Der Erwartungswert

von diskreten reellwertigen Zufallsvariablen


Teil 1

X sei eine Zufallsvariable, deren Zielbereich
 \mathbb{R} (die Menge der reellen Zahlen)
oder eine Teilmenge von \mathbb{R}
ist.

Außerdem existiere eine abzählbare Menge $S \subset \mathbb{R}$ mit
 $\mathbf{P}(X \in S) = 1$.

Wir sagen dann:


X ist eine diskrete reellwertige Zufallsvariable



Eine einprägsame Kenngröße
für die *Lage* der Verteilung von X ist das mit den
Wahrscheinlichkeiten gewichtete Mittel
der möglichen Werte von X :

$$\mathbf{E}[X] := \sum_{a \in S} a \mathbf{P}(X = a) .$$

Man spricht vom *Erwartungswert* von X .
(Wir bezeichnen ihn auch mit μ oder μ_X .)




Das elementarste Beispiel:

$$Z = \begin{cases} 1 & \text{mit Wahrscheinlichkeit } p \\ 0 & \text{mit Wahrscheinlichkeit } q = 1 - p \end{cases}$$

$$\mathbf{E}[Z] = p \cdot 1 + q \cdot 0 = p$$

Dieses Beispiel entspricht dem einfachen Münzwurf:




$$\{X = \text{Kopf}\} = \{Z = 1\}$$

Man sagt auch:

Z ist die *Indikatorvariable* des Ereignisses $\{X = \text{Kopf}\}$

$$Z = I_{\{X=\text{Kopf}\}}, \quad \mathbf{E}[Z] = \mathbf{P}(X = \text{Kopf}).$$

Oder in unserem Logo der ersten Stunde:



$$\{X \in A\} = \{Z = 1\}$$

Man sagt auch:

Z ist die *Indikatorvariable* des Ereignisses $\{X \in A\}$

$$Z = I_{\{X \in A\}}, \quad \mathbf{E}[Z] = \mathbf{P}(X \in A).$$

Für allgemeines diskretes, reellwertiges X hatten wir

$$\mathbf{E}[X] = \sum_{a \in S} a \mathbf{P}\{X = a\}$$

$$= \sum_{a \in S} a \rho(a)$$

mit $\rho(a) :=$ Verteilungsgewichte von X

Wohlgemerkt:

Der Erwartungswert der Zufallvariablen X
hängt nur von deren Verteilung ρ ab.

X

eine Zufallsgröße;

$E[X]$


eine Zahl.


Beispiel:

Eine faire Münze wird dreimal geworfen.


$X :=$ Anzahl der geworfenen Köpfe.


Eine faire Münze wird dreimal geworfen.






$$\mathbf{E}[X] = \sum a \mathbf{P}(X = a)$$









$E[X]$ gehört hier gar nicht zum Wertebereich von X

$a = \text{Anzahl Kopf}$


und kann in dem Sinn
kein "erwarteter Wert" von X sein




Was denn dann?



Wie erlebt man den Erwartungswert?




Durch wiederholtes Werfen
der drei Münzen




$a = \text{Anzahl Kopf}$


80 Wiederholungen: X_1, X_2, \dots, X_{80}




$$M_n := (X_1 + X_2 + \dots + X_n) / n$$




$$M_n := (X_1 + X_2 + \dots + X_n) / n$$




$$M_n := (X_1 + X_2 + \dots + X_n) / n$$




$$M_n := (X_1 + X_2 + \dots + X_n) / n$$




$$M_n := (X_1 + X_2 + \dots + X_n) / n$$




$$M_n := (X_1 + X_2 + \dots + X_n) / n$$




$$M_n \rightarrow \mathbf{E}[X]$$




Warum?



$$M_n = \sum a \#\{\text{W\u00fcrfe mit Ergebnis } a\}/n$$



$$M_n = \sum a \#\{\text{W\u00fcrfe mit Ergebnis } a\}/n$$
$$\rightarrow \sum a \mathbf{P}(X = a)$$



Dazu später mehr.

Für den Moment nur als kurzer Ausblick:

DAS GESETZ DER GROSSEN ZAHLEN

Sei X eine Zufallsgröße mit Erwartungswert $\mathbf{E}[X]$.

Seien X_1, X_2, \dots unabhängige Kopien von X .

Dann gilt

$$\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \rightarrow \mathbf{E}[X]$$

Zu klären

1. Was heißt „unabhängig“?
2. Was heißt „ \rightarrow “?

Zwei Vorstellungen von $\mathbf{E}[X]$

1. Gewichtetes Mittel

der möglichen Werte:

$$\mathbf{E}[X] := \sum a\mathbf{P}(X = a)$$

2. Langzeitmittelwert

bei unabhängigen Wiederholungen:

$$\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \rightarrow \mathbf{E}[X]$$

Die wichtigste Eigenschaft des Erwartungswerts ist die

Additivität

$$\mathbf{E}[X + Y] = \mathbf{E}[X] + \mathbf{E}[Y]$$

Die Additivität des Erwartungswerts
wird sofort klar aus der Vorstellung als Langzeitmittelwert
bei “unabhängigen Wiederholungen”:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{n}((X_1 + Y_1) + \dots + (X_n + Y_n)) \\ &= \frac{1}{n}(X_1 + \dots + X_n) + \frac{1}{n}(Y_1 + \dots + Y_n) \\ & \rightarrow \mathbf{E}[X] + \mathbf{E}[Y] \end{aligned}$$

BEISPIEL 1

Erwartungswert der Binomialverteilung

X sei $\text{Bin}(n, p)$ verteilt.

$$\mathbf{E}[X] = ?$$

$$\sum_{k=0}^n k \mathbf{P}(X = k) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \dots$$

Es GEHT so (vgl Buch * Seite 26)

*G. Kersting, A. Wakolbinger, Elementare Stochastik, Birkhäuser, 2. Aufl., 2010

Aber es geht auch einfacher:

Sei $Z = (Z_1, \dots, Z_n)$ ein n -facher p -Münzwurf.

Dann ist $(Z_1 + \dots + Z_n)$ $\text{Bin}(n, p)$ -verteilt.

$$\mathbf{E}[Z_1 + \dots + Z_n] = \mathbf{E}[Z_1] + \dots + \mathbf{E}[Z_n]$$

$$\mathbf{E}[Z_i] = 1 \cdot p + 0 \cdot q = p$$

Fazit:

Der Erwartungswert einer $\text{Bin}(n, p)$ verteilten ZV ist

np .

BEISPIEL 2

Ziehen ohne Zurücklegen

Eine Urne enthält r rote und b blaue Kugeln.

ooooooooooooo $r = 8$ $b = 5$

Aus der Urne werden ohne Zurücklegen n Kugeln gezogen.

ooooooo $n = 9$

$R :=$ Anzahl der gezogenen roten Kugeln

$\mathbf{P}(R = k)?$

$$\mathbf{P}(R = k) = \binom{r}{k} \binom{b}{n-k} / \binom{r+b}{n}$$

Eine ZV mit diesen Verteilungsgewichten ($k = 0, \dots, n$)

heißt

hypergeometrisch verteilt zu den Parametern $(n, r + b, r)$.

(vg. Buch Seite 30)

$$\mathbf{P}(R = k) = \binom{r}{k} \binom{b}{n-k} / \binom{r+b}{n}$$

$$\mathbf{E}(R) = ?$$

$$\mathbf{E}[R] = \sum_{k=0}^n k \binom{r}{k} \binom{b}{n-k} / \binom{r+b}{n} = \dots$$

Es GEHT so (vgl. Buch Seite 32)

Aber es geht auch einfacher.

$$R = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n$$

$Z_i = 1$ falls i -te Kugel rot

$Z_i = 0$ falls i -te Kugel blau

oooooooooooo

$r = 8$ $b = 5$

$$\mathbf{P}(Z_i = 1) = ?$$

Man stelle sich vor, die Nummern der Züge werden als rein zufällige Permutation an die $r + b$ Kugeln vergeben.

Wie wahrscheinlich ist es,
dass Nummer i auf eine rote Kugel fällt?

$$R = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n$$

$Z_i = 1$ falls i -te Kugel rot

$Z_i = 0$ falls i -te Kugel blau

oooooooooooo

$r = 8$ $b = 5$

$$\mathbf{P}(Z_i = 1) = \frac{r}{r + b}$$

Man stelle sich vor, die Nummern der Züge werden als rein zufällige Permutation an die $r + b$ Kugeln vergeben.

Wie wahrscheinlich ist es,
dass Nummer i auf eine rote Kugel fällt?

$$R = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n$$

$Z_i = 1$ falls i -te Kugel rot

$Z_i = 0$ falls i -te Kugel blau

oooooooooooo

$r = 8$ $b = 5$

$$\mathbf{P}(Z_i = 1) = \frac{r}{r + b}$$

$$\mathbf{E}[Z_i] = \frac{r}{r+b}$$

$$\mathbf{E}[R] = \mathbf{E}[Z_1] + \mathbf{E}[Z_2] + \dots + \mathbf{E}[Z_n]$$

$$\mathbf{E}[R] = n \frac{r}{r + b}$$

BEISPIEL 3

Runs beim Münzwurf

$Z := (Z_1, Z_2, \dots, Z_n)$ n-facher p-Münzwurf

$$\mathbf{P}(Z_i = 1) = p \quad \mathbf{P}(Z_i = 0) = q := 1 - p$$

Run: ein Block von Nullen (Einsen),
der nicht echt in einem größeren Block enthalten ist

$R :=$ Anzahl Runs in Z

$$00000000 \quad R = 1$$

$$11100011 \quad R = 3$$

$$10101010 \quad R = 8$$

$$\mathbf{E}[R] = ?$$

Dazu schreiben wir R als Summe von Zählern.

Bei jedem Wurf zählen wir eins dazu,
wenn bei diesem Wurf ein Run beginnt:

$Y_i := 1$ falls bei i ein Run beginnt, $Y_i := 0$ sonst

$$R = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n$$

$$Y_1 \equiv 1$$

$$\{Y_i = 1\} = \{(Z_{i-1}, Z_i) = (0, 1) \text{ oder } (1, 0)\} \quad (i > 1)$$

$$\mathbf{P}(Y_i = 1) = qp + pq \quad (i > 1)$$

$$\mathbf{E}[Y_i] = 2pq \quad (i > 1)$$

$$\mathbf{E}[R] = \mathbf{E}[Y_1] + \mathbf{E}[Y_2] + \mathbf{E}[Y_3] + \dots + \mathbf{E}[Y_n]$$

$$\mathbf{E}[R] = 1 + 2pq(n - 1)$$