


# Vorlesung 3a


## Der Erwartungswert

von diskreten reellwertigen Zufallsvariablen

# 0. Diskrete reellwertige Zufallsvariable

$X$  sei eine Zufallsvariable, deren Zielbereich  
 $\mathbb{R}$  (die Menge der reellen Zahlen)  
oder eine Teilmenge von  $\mathbb{R}$   
ist.






Außerdem existiere eine abzählbare\* Menge  $S \subset \mathbb{R}$  mit

$$\mathbf{P}(X \in S) = 1.$$

\*d.h. endliche oder abzählbar unendliche



Wir sagen dann:

$X$  ist eine **diskrete reellwertige** Zufallsvariable

# 1. Der Erwartungswert als gewichtetes Mittel


Eine einprägsame Kenngröße  
für die *Lage* der Verteilung von  $X$

ist das mit den Wahrscheinlichkeiten gewichtete Mittel  
der möglichen Werte von  $X$ :

$$\mathbf{E}[X] := \sum_{a \in S} a \mathbf{P}(X = a) .$$

Man spricht vom *Erwartungswert von  $X$* .

(Wir bezeichnen ihn auch mit  $\mu$  oder  $\mu_X$ .)



Das elementarste Beispiel:

$$Z = \begin{cases} 1 & \text{mit Wahrscheinlichkeit } p \\ 0 & \text{mit Wahrscheinlichkeit } q = 1 - p \end{cases}$$


Man erinnere sich an die Situation der ersten Stunde:  
Rein zufällige Wahl eines Punktes aus dem Quadrat,  
die Teilmenge  $A$  hat den Flächenanteil  $p$ ;  
gezählt wird, wenn der Punkt in  $A$  fällt.

Das elementarste Beispiel:

$$Z = \begin{cases} 1 & \text{mit Wahrscheinlichkeit } p \\ 0 & \text{mit Wahrscheinlichkeit } q = 1 - p \end{cases}$$

$$\mathbf{E}[Z] = p \cdot 1 + q \cdot 0 = p$$

Dieses Beispiel entspricht dem einfachen Münzwurf:




$$\{Y = \text{Kopf}\} = \{Z = 1\}$$

Man sagt auch:

$Z$  ist die *Indikatorvariable* des Ereignisses  $\{Y = \text{Kopf}\}$

$$Z = I_{\{Y=\text{Kopf}\}}, \quad \mathbf{E}[Z] = \mathbf{P}(Y = \text{Kopf}).$$

Oder in unserem Logo der ersten Stunde:



$$\{Y \in A\} = \{Z = 1\}$$

Man sagt auch:

$Z$  ist die *Indikatorvariable* des Ereignisses  $\{Y \in A\}$

$$Z = I_{\{Y \in A\}}, \quad \mathbf{E}[Z] = \mathbf{P}(Y \in A).$$

Für allgemeines diskretes, reellwertiges  $X$  hatten wir

$$\begin{aligned}\mathbf{E}[X] &= \sum_{a \in S} a \mathbf{P}\{X = a\} \\ &= \sum_{a \in S} a \rho(a)\end{aligned}$$

mit  $\rho(a) :=$  Verteilungsgewichte von  $X$

Wohlgemerkt:

Der Erwartungswert der Zufallvariablen  $X$

hängt nur von deren Verteilung  $\rho$  ab.

Synonym sprechen wir daher auch manchmal vom

*Erwartungswert der Verteilung  $\rho$ .*

$X$

eine Zufallsgröße;

$E[X]$

eine Zahl.


## 2. Die Anzahl der Erfolge beim Münzwurf


Beispiel:

Eine faire Münze wird dreimal geworfen.


$X :=$  Anzahl der geworfenen Köpfe.


Eine faire Münze wird dreimal geworfen.






$$\mathbf{E}[X] = \sum a \mathbf{P}(X = a)$$







Die Zahl  $\mathbf{E}[X]$  gehört hier gar nicht zum Wertebereich von  $X$




und kann in dem Sinn  
kein "erwarteter Wert" von  $X$  sein




Was denn dann?



Wie erlebt man den Erwartungswert?




Durch wiederholtes Werfen  
der drei Münzen



$a = \text{Anzahl Kopf}$


### 3. Der Erwartungswert als Langzeitmittel

Wiederholtes Werfen  
der drei Münzen




$a = \text{Anzahl Kopf}$

80 Wiederholungen:  $X_1, X_2, \dots, X_{80}$







$$M_n := (X_1 + X_2 + \dots + X_n) / n$$




$$M_n := (X_1 + X_2 + \dots + X_n) / n$$




$$M_n := (X_1 + X_2 + \dots + X_n) / n$$




$$M_n := (X_1 + X_2 + \dots + X_n) / n$$




$$M_n := (X_1 + X_2 + \dots + X_n) / n$$




$$M_n \rightarrow \mathbf{E}[X]$$



Warum?



$$M_n = \sum a \#\{\text{W\u00fcrfe mit Ergebnis } a\}/n$$
$$\rightarrow \sum a \mathbf{P}(X = a)$$



Dazu später mehr.

Für den Moment nur als kurzer Ausblick:

## DAS GESETZ DER GROSSEN ZAHLEN

Sei  $X$  eine Zufallsgröße mit Erwartungswert  $\mathbf{E}[X]$ .

Seien  $X_1, X_2, \dots$  unabhängige Kopien von  $X$ .

Dann gilt

$$\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \rightarrow \mathbf{E}[X]$$

Zu klären

1. Was heißt „unabhängig“?
2. Was heißt „ $\rightarrow$ “?

Diese Klärung wird in der Vorlesung  
in wenigen Wochen erfolgen.

Jetzt halten wir erst einmal fest:

Zwei Vorstellungen von  $\mathbf{E}[X]$

1. Gewichtetes Mittel

der möglichen Werte:

$$\mathbf{E}[X] := \sum a \mathbf{P}(X = a)$$

2. Langzeitmittelwert

bei unabhängigen Wiederholungen:

$$\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \rightarrow \mathbf{E}[X]$$

## 4. Die Additivität des Erwartungswertes - anschaulich

Die wichtigste Eigenschaft des Erwartungswerts ist die

Additivität

$$\mathbf{E}[X + Y] = \mathbf{E}[X] + \mathbf{E}[Y]$$

Die Additivität des Erwartungswerts wird intuitiv sofort klar aus der Vorstellung als Langzeitmittelwert bei “unabhängigen Wiederholungen”:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{n}((X_1 + Y_1) + \dots + (X_n + Y_n)) \\ &= \frac{1}{n}(X_1 + \dots + X_n) + \frac{1}{n}(Y_1 + \dots + Y_n) \\ & \rightarrow \mathbf{E}[X] + \mathbf{E}[Y] \end{aligned}$$

Ein prominenter Fall ist

$$X = Z_1 + \cdots + Z_n,$$

wobei die  $Z_1, \dots, Z_n$  nur die Werte 0 oder 1 annehmen.

Dann gilt

$$\mathbf{E}[Z_i] = \mathbf{P}(Z_i = 1)$$

und somit

$$\mathbf{E}[X] = \mathbf{P}(Z_1 = 1) + \cdots + \mathbf{P}(Z_n = 1) .$$

## 5. Der Erwartungswert der Binomialverteilung

## BEISPIEL 1

### Erwartungswert der Binomialverteilung

$X$  sei  $\text{Bin}(n, p)$  verteilt.

$$\mathbf{E}[X] = ?$$

$$\sum_{k=0}^n k \mathbf{P}(X = k) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \dots$$

Es GEHT so (vgl Buch Seite 23-24 )

Aber es geht auch einfacher:

Sei  $Z = (Z_1, \dots, Z_n)$  ein  $n$ -facher  $p$ -Münzwurf.

Dann ist  $(Z_1 + \dots + Z_n)$   $\text{Bin}(n, p)$ -verteilt.

$$\mathbf{E}[Z_1 + \dots + Z_n] = \mathbf{E}[Z_1] + \dots + \mathbf{E}[Z_n]$$

$$\mathbf{E}[Z_i] = 1 \cdot p + 0 \cdot q = p$$

Fazit:

Der Erwartungswert einer  $\text{Bin}(n, p)$  verteilten ZV ist

$np$ .

## 6. Der Erwartungswert der hypergeometrischen Verteilung

## BEISPIEL 2

### Ziehen ohne Zurücklegen

Eine Urne enthält  $r$  rote und  $b$  blaue Kugeln.

ooooooooooooo       $r = 8$      $b = 5$

Aus der Urne werden ohne Zurücklegen  $n$  Kugeln gezogen.

ooooooo       $n = 9$

$R :=$  Anzahl der gezogenen roten Kugeln

$\mathbf{E}[R] = ?$

Verteilung von R ?

$$\mathbf{P}(R = k) = ?$$

$$\mathbf{P}(R = k) = \binom{r}{k} \binom{b}{n-k} / \binom{r+b}{n}$$

Eine ZV mit diesen Verteilungsgewichten ( $k = 0, \dots, n$ )

heißt

**hypergeometrisch verteilt** zu den Parametern  $(n, r + b, r)$ .

(vg. Buch Seite 28)

$$\mathbf{P}(R = k) = \binom{r}{k} \binom{b}{n-k} / \binom{r+b}{n}$$

$$\mathbf{E}(R) = ?$$

$$\mathbf{E}[R] = \sum_{k=0}^n k \binom{r}{k} \binom{b}{n-k} / \binom{r+b}{n} = \dots$$

Es GEHT so (vgl. Buch Seite 32)

Aber es geht auch einfacher.

$$R = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n$$

$Z_i = 1$  falls  $i$ -te gezogene Kugel rot

$Z_i = 0$  falls  $i$ -te gezogene Kugel blau

ooooooooooooo       $r = 8$      $b = 5$

$$\mathbf{P}(Z_i = 1) = ?$$

Man stelle sich vor, die Nummern der Züge werden als rein zufällige Permutation an die  $r + b$  Kugeln vergeben.

Wie wahrscheinlich ist es,  
dass Nummer  $i$  auf eine rote Kugel fällt?

$$R = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n$$

$Z_i = 1$  falls  $i$ -te gezogene Kugel rot

$Z_i = 0$  falls  $i$ -te gezogene Kugel blau

ooooooooooooo       $r = 8$      $b = 5$

$$\mathbf{P}(Z_i = 1) = \frac{r}{r + b}$$

Man stelle sich vor, die Nummern der Züge werden  
als rein zufällige Permutation an die  $r + b$  Kugeln vergeben.

Wie wahrscheinlich ist es,  
dass Nummer  $i$  auf eine rote Kugel fällt?

$$R = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n$$

$Z_i = 1$  falls  $i$ -te gezogene Kugel rot

$Z_i = 0$  falls  $i$ -te gezogene Kugel blau

ooooooooooooo       $r = 8$      $b = 5$

$$\mathbf{P}(Z_i = 1) = \frac{r}{r + b}$$

$$\mathbf{E}[Z_i] = \frac{r}{r+b}$$

$$\mathbf{E}[R] = \mathbf{E}[Z_1] + \mathbf{E}[Z_2] + \dots + \mathbf{E}[Z_n]$$

$$\mathbf{E}[R] = n \frac{r}{r + b}$$

## 7. Der Erwartungswert einer Anzahl von Runs

### BEISPIEL 3

#### Runs beim fairen Münzwurf

$Z := (Z_1, Z_2, \dots, Z_n)$  n-facher fairer Münzwurf

$$P\{Z_i = 1\} = \frac{1}{2} \quad P\{Z_i = 0\} = \frac{1}{2}$$

Run: ein Block von Nullen (Einsen),  
der nicht echt in einem größeren Block enthalten ist

$R :=$  Anzahl Runs in  $Z$

$$00000000 \quad R = 1$$

$$11100011 \quad R = 3$$

$$10101010 \quad R = 8$$

$$\mathbf{E}[R] = ?$$

Dazu schreiben wir  $R$  als Summe von Zählern.

Bei jedem Wurf zählen wir eins dazu,  
wenn bei diesem Wurf ein Run beginnt:

$Y_i := 1$  falls bei  $i$  ein Run beginnt,  $Y_i := 0$  sonst

$$R = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n$$

$$Y_1 \equiv 1$$

$$\{Y_i = 1\} = \{(Z_{i-1}, Z_i) = (0, 1) \text{ oder } (1, 0)\} \quad (i > 1)$$

$$P(Y_i = 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \quad (i > 1)$$

$$\mathbf{E}[Y_i] = \frac{1}{2} \quad (i > 1)$$

$$\mathbf{E}[R] = \mathbf{E}[Y_1] + \mathbf{E}[Y_2] + \mathbf{E}[Y_3] + \dots + \mathbf{E}[Y_n]$$

$$\mathbf{E}[R] = 1 + \frac{1}{2}(n - 1)$$